

HRP-羊抗兔 IgG (H+L)说明书

1 产品基本信息

产品名称（中文）：HRP-羊抗兔 IgG (H+L)

产品名称（英文）：HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)

产品编号：MD1631

2 规格或纯度

20 μ L, 100 μ L

3 产品介绍

产品简介：

HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H&L) 用于 DAB 显色推荐稀释比例为 1:500-1:1000, 用于 WB 推荐稀释比例为 1:5000-1:25000, 用于 IHC 推荐稀释比例为 1:20-1:1000。

适用范围：

WB, IHC, DAB 显色

4 储存与运输

储存条件：-20 $^{\circ}$ C 密封保存

运输条件：冰袋运输

5 使用方法（仅供参考）

HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H&L) 用于 DAB 显色推荐稀释比例为 1:500-1:1000, 用于 WB 推荐稀释比例为 1:5000-1:25000, 用于 IHC 推荐稀释比例为 1:20-1:1000, 实验应根据抗原以及抗体的具体情况进行调整（推荐比例使用次数请见表 1）。

表 1. 按照 100 μ L/次, 使用次数

应用	20 μ L	100 μ L
DAB 显色	100-200 次	500-1000 次
WB	1000-5000 次	5000-25000 次
IHC	4-200 次	20-1000 次

6 注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底, 再进行后续实验。
- 抗体缓冲液, 最好不含甘油、叠氮钠、氨基物质（甘氨酸、Tris 等）。少量氨基物质（ <0.05 M）和少量叠氮钠（ $<0.2\%$ ），对实验不会产生严重影响。
- 为避免反复冻融, 可对本产品进行小量分装。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。