

NerveRed C2 神经元荧光探针

1 产品基本信息

产品名称（中文）：NerveRed C2 神经元荧光探针

产品名称（英文）：NerveRed C2 Neuron Probe

产品编号：MX1506

2 规格或纯度

5×1 mg

3 产品介绍

产品简介：

神经末梢探针是一系列阳离子型苯乙烯基荧光染料，用于跟踪神经肌肉连接或突触的突触活动。这类染料通常具有亲脂性尾部（两个碳链）和带阳离子的高亲水性头部。NerveRed 系列探针是具有三个双键的染料。

阳离子苯乙烯基染料是通过活性依赖性染色突触小泡来发挥功能。染料与细胞或组织共孵育时，染料的水相部分没有荧光，而染料的亲脂性尾部插入细胞膜并呈现强荧光。神经刺激后，在进行胞吞作用时，染料被包裹在囊泡内，因此，洗去细胞表面附着的染料后，荧光信号强弱表示新形成的囊泡的数量的多少。反之，在胞吐作用时，染料与神经递质一起从囊泡释放，导致荧光信号减少。因此，荧光强度的变化反映了胞吞/胞吐或突触活动的情况。内吞过程中荧光增加的速率“结合速率”和胞吐过程中荧光减少的速率“解离速率”因染料种类而异。通常，具有较长亲脂性尾部和更多双键的染料对膜具有较高的亲和力，因此具有较高的结合速率和较低的解离速率。激发发射波长可参考 FM4-64，请见产品参数。

本产品等同于 FM4-64，NerveRed C2 染料不能用于固定细胞染色，固定细胞的染色可选择 NM 系列染料。

产品特点：

- 稳定性好：荧光亮度强且抗淬灭能力好；
- 批间差小：公司自研产品，批间差控制的好；
- 使用方便：可搭配公司其它试剂，灵活便捷。

适用范围：

神经元荧光染料

产品参数

外观：可溶于水的紫色固体


Ex/Em: 543/- nm (emission in MeOH is too weak to measure)

Ex/Em : 510/750 nm (in membranes)


分子式：C₃₀H₄₅Br₂N₃

分子量：607.5

分子结构图：



光谱图:



4 储存与运输

储存条件: -20 °C 避光保存

运输条件: 冰袋运输

5 使用方法 (仅供参考)

一、自备材料

1. 耗材:离心管
2. 试剂:(1)台氏液 (2)河豚毒素(TTX) (可选)
3. 仪器:荧光显微镜或激光扫描共聚焦显微镜

二、操作步骤

以下是在盖玻片上对培养的神经元细胞的神经末梢染色。用于特定实验的最佳方案需要由实验者摸索。

神经末梢染料也可用于标记非神经元细胞类型的内吞囊泡。染色可以在 4°C 进行以选择性标记质膜；在室温或 37°C 下，染料的内吞通常在 10 min 内发生。可以使用台氏液液或其它缓冲液，可选择性添加钠离子通道阻断剂河豚毒素(TTX)，其目的是阻断动作电位并防止染色后的突触囊泡释放。

1. 在 50 mM 台氏液中稀释神经末梢染料至最终浓度为 4 μM。在室温下将含有细胞的盖玻片置于该溶液中 1 min，使细胞完全浸没。
2. 将盖玻片转移至台氏液+0.5 μM 河豚毒素 (TTX) 溶液中，室温下孵育 1 min。
3. 室温下，用台氏液+0.5 μM TTX 溶液反复多次洗涤盖玻片。
4. 荧光显微镜选择绿光激发，Cy7 滤光片或者通道进行观察拍照。

6 注意事项

- 使用前请将产品瞬时离心至管底，再进行后续实验。
- 荧光染料均存在淬灭问题，实验操作时请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。
- 本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品和药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。